

ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਟੀ.ਬੀ. ਦਾ ਹੱਲ



ਟੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਖੰਧੇ ਜਾਂ ਛਿੱਕੇ।



ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਖੁੱਕੋ।



ਲੱਛਣ ਦਿੱਖਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।



ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਲਓ।



ਟੀ.ਬੀ. ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ: ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਘਿਓ, ਰੋਟੀ, ਚਾਵਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਅਮਰੂਦ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਜਿਹੇ ਫਲ, ਆਦਿ

ਨਿਕਸ਼ਯ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ

ਨਿਕਸ਼ਯ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ **₹500** ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਕਸ਼ਯ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਦੱਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਕਸ਼ਯ ਦਾ ਸਦੱਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ/ਜੀਤ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਓ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਓ:

- ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
- ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ
- ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਤਾ
- ਬੈਂਕ ਦਾ IFSC ਕੋਡ

ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ

ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ID ਸਬੂਤ) ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ

ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ



ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ



ਕੀ ਹੈ ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਟੀ.ਬੀ. ਬੈਕਟੀਰਿਆ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਛਿੱਕਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਟੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿੱਖਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।



ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਮੁਖ ਲੱਛਣ



2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਘ



ਖੰਘਦੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ



ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ



ਵਜਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ



ਖੰਘ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆਉਣਾ



ਭੁੱਖ ਘਟਣਾ

ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ



ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬਲਗਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਟੀ.ਬੀ. ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਘ ਕੇ ਬਲਗਮ ਦਿਓ, ਖੁੱਕ ਨਹੀਂ।

ਟੀ.ਬੀ. ਦਾ ਇਲਾਜ



ਟੀ.ਬੀ. ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ।



ਦਵਾਈ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ।



ਇਲਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਟੀ.ਬੀ. ਲਾਇਲਾਜ ਜਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ



ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੰਬਾਕੂ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰੇਟ, ਹੁੱਕਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।



ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਪੇਸ਼ਾਬ, -ਲਾਰ-ਹੁੱਝਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾਰੰਗੀ ਜਾਂ ਲਾਲ ਹੋਣਾ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ। ਤਕਲੀਫ ਵਧਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।

