



## نکشیہ غذائی یوجنا

نکشیہ غذائی یوجنا کے تحت حکومت ہند ٹی بی کے مریضوں کو صحت مند غذا کیلئے 500/- فی ماہ کی مالی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ یہ مدد علاج پورا ہونے تک جاری رہتی ہے۔

اس یوجنا سے فائدہ اٹھانے کیلئے مریض کا حکومت کے نکشیہ یوجنا کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ نکشیہ کا ممبر ہونے کے نیچے لکھی پوری جانکاری اپنے ڈاکٹر / جیت ٹیم کو دستیاب کرائیں۔

اس یوجنا کا فائدہ لینے کیلئے برائے مہربانی نیچے دی گئی جانکاری دستیاب کرائیں:

- مریض کا نام اور فون نمبر
- مریض کا بینک اکاؤنٹ نمبر
- بینک کا نام، بینک کا پتا
- بینک کا IFSC کوڈ

تصدیق کیلئے اپنی بینک پاس بک ضرور دکھائیں۔

بینک پاس بک اور آدھار کارڈ (یا کوئی اور ID پروف) کی فوٹو کاپی

## صحیح جانکاری ہے ٹی بی سے راحت




ادھر ادھر نہ تھونکیں۔



ٹی بی کو پھیلنے سے روکنے کیلئے مریض ہمیشہ رومال سے منہ ڈھنک کر کھانسیں اور چھینکیں۔



ٹی بی کے علاج کے دوران بیماری سے لڑنے کی قوت کیلئے صحت مند غذا لیں۔



علامات دکھائی دینے پر ڈاکٹر کی صلاح لے کر جانچ کروائیں۔




ٹی بی کیلئے صحت مند غذا لیں: دالیں، اناج، دودھ اور دودھ سے بنی مصنوعات، تیل اور گھی، روٹی، چاول، مونگ پھلی، امرود اور کیلے جیسے پھل، وغیرہ۔

## کیا ہے ٹی بی کی بیماری؟

ٹی بی بیکٹیریا سے پھیلنے والا متعدی مرض ہے جس کا شکار کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹی بی کے جراثیم مریض کے کھانسنے یا چھینکنے سے ہوا میں مل جاتے ہیں اور دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ گھبرائیے نہیں، ٹی بی سے بچا بھی جاسکتا ہے اور ٹی بی کو ہرایا بھی جاسکتا ہے۔ ٹی بی کی علامات دکھانی دینے پر فوراً ڈاکٹر کی صلاح لیں۔



## ٹی بی کی خاص علامات



کھانستے ہوئے منہ سے خون آنا۔



2 ہفتے سے زیادہ کھانسی۔



وزن کم ہونا۔



بخار آنا۔



بھوک کم ہونا۔



کھانسی کے ساتھ بلغم آنا۔

## ٹی بی کی جانچ میں دیر نہ کریں



ٹی بی کی جانچ کیلئے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ بلغم کی جانچ سے ٹی بی کا پتا لگایا جاسکتا ہے۔ دھیان رہے، صحیح جانچ کیلئے ٹھیک سے کھانسی کے بلغم دیں، تھوک نہیں۔

## ٹی بی کا علاج



علاج درمیان چھوڑنے سے یا دوا حسب معمول طور سے نہ لینے سے ٹی بی لا علاج اور جان لیوا ہو سکتا ہے۔



دوا جتنے وقت تک کہا جائے اتنے وقت تک پوری لیں۔ ڈاکٹر کی صلاح پر ہی دوا بند کریں۔



ٹی بی کا علاج ہو سکتا ہے۔ دوا 6 سے 8 مہینے یا زیادہ وقت تک لگاتار چلتی ہے۔

## علاج کے دوران دھیان رکھیں



ٹی بی کی دوا لینے پر کچھ اثر ہو سکتے ہیں جیسے کہ دل مچلنا، الٹی آنا، پیشاب - لار - آنسوؤں کا رنگ نارنگی یا لال ہونا، پیٹ درد ہونا۔ ان سے گھبرائیں نہیں، تکلیف بڑھنے پر ڈاکٹر کی صلاح لیں لیکن اپنے آپ دوا بند نہ کریں۔



ٹی بی کے علاج کے دوران تمباکو، بیڑی، سگریٹ، پگھا، شراب جیسی کسی بھی نشہ آور چیز سے پرہیز کریں۔