

دوا لینے کے آسان طریقے

شہد کے ساتھ لے سکتے ہیں



کیلے کے ساتھ دوا لے سکتے ہیں





دوا کو باریک کر کے، اُسے ایک چمچہ کھانے کے ساتھ لے سکتے ہیں

دوا کو باریک کر کے، اُسے شکر میں ملا کر لے سکتے ہیں

ٹی بی کے انفیکشن کا علاج کے دوران کبھی کبھی دوا کی وجہ سے کچھ زحمتوں کا شکار ہوسکتے ہیں، جیسے کہ:

لگاتار کمزوری،
تھکان، بخار یا
پیٹ میں درد

بغیر کسی وجہ سے بھوک کم
لگنا، متلی یا
اُلٹی ہونا



نارنگی / لال پیشاب
اور آنسو

ہاتھوں اور پیروں میں
لگاتار جھنجھٹی اور
بے جسی


ان سارے مضر اثرات کا علاج ممکن ہے اس لئے بغیر رکاوٹ وقت پر دوا لیتے رہیں اور دوا کا کورس پورا کریں۔

ٹی بی ہونے سے پہلے اُسے ہرائیں
بتائی گئی سبھی دوائیں لیں اور اُس کا کورس پورا کریں۔

اپنی دوا ہر دن ایک ہی
وقت پر لیں۔



گھر کے کسی فرد یا دوست
سے کہیں کہ وہ آپ کو ہر دن
اپنی دوا لینا یاد دلائے۔



ناشتے یا دوپہر کے کھانے،
یا پھر دوپہر اور رات کے
کھانے کے بیچ کے وقت میں
دوا لیں۔ شراب اور تمباکو نوش کرنے
سے علاج میں پریشانی
آسکتی ہے۔ ان سے بچیں۔



اپنی دواؤں کو ٹھنڈی اور
خشک جگہ پر سنبھال کر رکھیں۔
ہر گولی کو تب ہی باہر
نکالیں جب آپ فوراً اُسے
کھانے والے ہوں۔

کچھ مضر اثرات ہوسکتے ہیں۔
اگر ہوں تو اپنے ڈاکٹر یا
نرس کو اُن کے بارے میں بتائیں۔

ہمیشہ غذائیت سے بھرپور
غذا کھانے کی کوشش کریں۔

پروجیکٹ جیت

جیت پروجیکٹ ٹی بی کو جڑ سے ختم کرنے کی ایک متحدہ کوشش ہے۔ ہمارا مقصد ہے ہر ٹی بی مریض کو صحیح جانکاری، جانچ، علاج اور سجاواؤ اُن کے علاج کی پوری مدت تک ملے۔ پروجیکٹ جیت کے تحت، ٹی بی مریضوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ، اُن کے اہل خانہ کو ٹی بی کی بیماری سے بچانے کی کوشش کی جارہی ہے۔ ٹی بی کے انفیکشن اور ٹی بی کے انفیکشن کا صحیح وقت پر علاج کرنے کے بارے میں آگاہی پھیلا کر، ٹی بی کو ہونے سے پہلے ہی ہرایا جاسکتا ہے۔ جیت پروجیکٹ، سرکار کے تعاون سے، مُلک کے کونے کونے میں پہنچ کر ٹی بی اور ٹی بی کے انفیکشن کی جانکاری، جانچ اور علاج میں لاکھوں خاندانوں کی مدد میں کام کر رہا ہے۔

خود کو اور اہل خانہ کو ٹی بی سے بچائیں



Joint
Effort for
Elimination of
Tuberculosis

پروجیکٹ جیت کا نمائندہ:

رابطہ نمبر:


ٹی بی

ٹی بی ایک متعدی مرض ہے جو متاثرہ مریض کے کھانسنے یا چھینکنے سے پھیل سکتا ہے۔

اگر سانس کے ذریعے سے ٹی بی کے بیکٹیریا آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو



ٹی بی کے بیکٹیریا آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، لیکن غیرفعال رہتے ہیں۔ اسے ٹی بی کا انفیکشن کہا جاتا ہے۔



ٹی بی کے بیکٹیریا آپ کو بیمار کر سکتے ہیں یا اسے فعال ٹی بی کہتے ہیں



آپ کا جسم ٹی بی کے بیکٹیریا کو مار دیتا ہے تاکہ وہ آپ کو ابھی یا مستقبل میں کبھی نقصان نہ پہنچا سکیں؛ یا

فعال ٹی بی

اگر آپ کے یا افراد خانہ کے کسی ممبر میں درج ذیل علامات دکھائی دیں

کھانسی، بخار



رات کو پسینہ آنا



بلاوجہ وزن گھٹنا، بچوں کا وزن نہ بڑھنا



بھوک نہ لگنا




تو فوراً ڈاکٹر سے صلاح لیں

ٹی بی کا انفیکشن


ٹی بی کا انفیکشن ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ٹی بی کے بیکٹیریا جسم میں رہتے تو ہیں لیکن صحت مند جسم کی بیماری سے لڑنے کی قوت کی وجہ سے وہ سوئے ہوئے رہتے ہیں یا اپنا کام نہیں کر پاتے ہیں۔ مستقبل میں کسی بھی وجہ سے بیماری سے لڑنے کی قوت کمزور ہونے پر یہ بیکٹیریا جسم میں فعال ہو کر فرد کو بیمار کر سکتے ہیں۔

بے خوف رہیں۔ ٹی بی کے انفیکشن کا علاج کر کے اسے ٹی بی میں بدلنے سے روکا جاسکتا ہے۔

ٹی بی کے انفیکشن سے ٹی بی پنپنے کے زیادہ جوکھم پر رہنے والے افراد



ڈائیبیٹیس، کڈنی کے مریض، ایچ آئی وی سے انفیکٹیڈ لوگ



شراب اور تمباکو نوش کرنے والے لوگ



حسب معمول سے کم وزن کے لوگ



5 سال سے کم عمر کے بچے

اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز ٹی بی سے انفیکٹیڈ فرد کے رابطے میں رہا ہے، تو اس سے آپ کو اور اُن میں بھی ٹی بی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

ٹی بی کے انفیکشن کی تشخیص کرنا

اگر آپ ٹی بی کے انفیکشن میں مبتلا ہیں



آپ کو دوسروں کو ٹی بی سے انفیکٹیڈ نہیں کر سکتے



آپ میں ٹی بی مرض کی کوئی علامات نہیں ہوں گی



آپ بیمار نہیں ہیں

لیکن آپ کو ٹی بی ہونے کا خطرہ ہے



ڈاکٹر ٹی بی کے انفیکشن کی جانچ خون یا جلد کی جانچ سے کر سکتے ہیں



دوا کے کورس سے ٹی بی کے بیکٹیریا کو ہلاک کیا جاسکتا ہے اس سے پہلے کہ بیدار ہوں اور فعال ٹی بی میں بدل جائیں۔

ٹی بی کے انفیکشن کا علاج :

علاج کی مدت 6 مہینوں تک



ٹی بی کے انفیکشن سے اپنے اور اپنے عزیزوں کا مستقبل ٹی بی سے آزاد رکھیں!